Quiz estratti dalla banca dati del sito www.infermiereonline.altervista.org e



La banca dati contiene oltre 10000 quiz dei concorsi svolti sino ad ora in tutta Italia.

- 1) Ognuno dei seguenti farmaci è utilizzato nel trattamento preventivo del disturbo bipolare tranne:
- A Sali di litio
- B Carbamazepina
- C Valproato di sodio
- D ** Clomipramina

www.infermiereonline.altervista.org

- 2) Quale tra le seguenti è una delle scale di valutazione della depressione?
 - A Minimental Scale
 - B Scala di Glasgow
 - C MMSE
 - D **MADRS
- 3) La contenzione fisica:
 - A **E' permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
 - B Non è mai permessa
 - C E' permessa su prescrizione medica
- D E' permessa se documentata esclusivamente spazio temporale www.infermiereonline.altervista.org
- 4) Quali delle seguenti patologie possono presentare una sintomatologia simile a quella del disturbo di panico:
- A Feocromocitoma
- B Convulsioni parziali complesse
- C Intossicazione da caffeina
- D * Tutte le patologie indicate
 - 5) Il disturbo da dimorfismo corporeo (dismorfofobia) è caratterizzato tipicamente da:

- A Elevata prevalenza
- B Maggiore frequenza nel sesso femminile
- C Umore depresso
- D* Eccessiva preoccupazione (fino alla convinzione delirante) per una immaginaria deformità e/o per una modesta imperfezione fisica www.infermiereonline.altervista.org

6) Il termine numbing descrive uno stato:

- A)Di dipendenza da sostanze ,tipico delle sindromi post-traumatiche da stress
- B) **Di coscienza simile allo stordimento e alla confusione
- C) Di veglia continua
- D)Di eccitabilità prolungata
- 7) Nella sindrome maniacale, il bisogno di sonno risulta:
 - A **Diminuito
 - B Aumentato
 - C Normale
 - D Maniacale

www.infermiereonline.altervista.org

8) I sintomi clinici di intossicazione da cocaina comprendono i seguenti segni tranne:

- A Sintomi psicotici con eccitamento
- B Aritmie cardiache
- C Ipertensione
- D* Umore depresso

9) Cosa differenzia l'anoressia nervosa dalla bulimia nervosa:

A La compulsività delle abbuffate

BL'iperattività

CLa frequenza delle abbuffate

D** Il peso corporeo

www.infermiereonline.altervista.org

.10) I sintomi caratteristici dell'attacco di panico sono:

A** Paura di svenire, morire, impazzire, perdere il controllo BPaura del giudizio degli altri CPaura di essere aggrediti D Paura di particolari oggetti

10) . Il delirium:

- A non è mai dovuto a eziologie molteplici
- B è tipico della schizofrenia ebefrenica
- C** può essere dovuto sia a intossicazione sia ad astinenza da sostanze
- D è sinonimo di delirio

11) La modalità più frequente del gesto nel tentato suicidio adolescenziale, è:

A impiccagione
Bcolpo di arma da fuoco
Cprecipitazione
D* assunzione di psicofarmaci
www.infermiereonline.altervista.org

12) Ai fini della prevenzione primaria dei disturbi mentali è utile:

A attuare la terapia sin dall'esordio dei disturbi

Baumentare i dosaggi dei farmaci assunti

C* agire sui fattori di rischio

D agire sulla compliance ai trattamenti

13) Una "complicazione" del processo fisiologico del lutto può più frequentemente condurre a:

A attacchi di panico

B crisi catatoniche C* depressione

D episodi schizofrenici

14) Il "Problem solving" si riferisce a:

A la capacità di comprendere ed eseguire comandi scritti

Bla soluzione di conflitti inconsci problematici

Cla capacità di risolvere problemi matematici

** l' utilizzo clinico della psicologia cognitiva per insegnare ai pazienti ad identificare e a risolvere i problemi come parte di processi più generali di auto-controllo

www.infermiereonline.altervista.org

Che cosa e' un messaggio "paradossale"? **15**)

è un messaggio ben augurante

Bè un messaggio caratterizzato dalla gioiosità

C* è un messaggio che afferma una cosa ad un livello (per es. verbale) e la nega ad un altro livello (per es. non verbale)

è un messaggio esclusivamente pubblicitario

Cos'è la confabulazione? **16**)

la falsa convinzione di vivere in un mondo fantastico

Bil bisogno ossessivo di raccontare favole

C* la ricostruzione fantastica di lacune mnesiche

l'uso di un linguaggio ricercato D

Le allucinazioni più tipiche della schizofrenia sono quelle: **17**)

olfattive

B tattili

C ** uditive

visive D

La dinamica temporale degli antidepressivi prevede che **18**) molti degli effetti indesiderati insorgano:

A* prima degli effetti terapeutici Bcontemporaneamente agli effetti terapeutici

Cdopo gli effetti terapeutici

una settimana dopo gli effetti sinaptici

www.infermiereonline.altervista.org

19) Per placebo si intende:

- A **Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
- B Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
- C Un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo
- D Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi

20) La dromofobia è la paura:

- A Degli alberi
- B **Di attraversare la strada
- C Di addormentarsi
- D Degli incidenti

21) Nell' ambito della schizofrenia la terapia familiare:

A* mira a risolvere i problemi interni al nucleo familiare Bmira a far esplodere i problemi del nucleo familiare Cè controindicata

D sostituisce la terapia farmacologica

www.infermiereonline.altervista.org

22) La tangenzialità è:

- A un disturbo extrapiramidale
 - B un disturbo delle senso-percezioni
 - C ** un disturbo del pensiero
- D un rituale ossessivo

23) Nel disturbo psicotico cronico indotto da alcol:

A il quadro si sviluppa sempre durante una intossicazione acuta B* le allucinazioni possono essere sia uditive sia visive Cil paziente non è mai un bevitore abituale D l'età media di insorgenza è intorno ai 18 anni non vi è mai agitazione psicomotoria

24) La fobia sociale è un disturbo caratterizzato da:

A* timore di situazioni nelle quali un individuo è in relazione sociale con altri

Btimore di trovarsi in luoghi dai quali sarebbe difficile allontanarsi Ctimore eccessivo conseguente alla vicinanza con animali

D timore di fenomeni naturali presenti nell'ambiente nessuna risposta è corretta

www.infermiereonline.altervista.org

25) Il sintomo agorafobico:

A è un termine in disuso, che andrebbe sostituito con quello più appropriato di "nevrosi fobica"

Bnon rientra nell'ambito generale della nevrosi fobica, perché va considerata come una manifestazione isterica

C* può essere presente nel disturbo da attacco di panico

D è un sintomo della schizofrenia

26) Nelle donne, il rischio di disturbi dell'umore è particolarmente elevato:

A nella pubertà

B nel primo trimestre di gravidanza

C ** nel periodo postpartum

D prima del matrimonio

27) I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono inseriti:

A* in ospedali generali

Bsolo in policlinici universitari

Csolo in cliniche private

D all'interno di ex ospedali psichiatrici

28) Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza previsto dalla legge 833

A* dura fino a 7 giorni ed è prorogabile

Bdura 3 giorni Cdura al massimo un mese D dura almeno un mese www.infermiereonline.altervista.org

29) L'acatisia e':

- A un disturbo dell'ideazione
- B un sintomo tipico della schizofrenia
- C indicativa di uno stato di ipotonia muscolare
- D ** una sindrome ipercinetica da neurolettici

30) La dendrofobia è la paura:

- A **Degli alberi
- B Di attraversare la strada
- C Di addormentarsi
- D Degli incidenti

www.infermiereonline.altervista.org