QUIZ A TEMA: Medicina urgenza emergenza 2

Quiz estratti dalla banca dati del sito www.infermiereonline.altervista.org e

La banca dati contiene oltre 12000 quiz dei concorsi svolti sino ad ora in tutta Italia.

1) **Un paziente che presenta dispnea assume:**

a) La posizione supina
b) La posizione ventrale
c) **La posizione ortopnoica
d) La posizione laterale sinistra

www.infermiereonline.altervista.org

2) **Il propafenone trova indicazione nel trattamento di:**

A** Fibrillazione atriale

B Blocco atrio-ventricolare (BAV) di I grado

C Blocco atrio-ventricolare (BAV) di II grado

D Infarto miocardico

3) **La TAC dell'encefalo senza mezzo di contrasto:**

A non ha nessuna indicazione nella diagnostica dell'ictus ischemico

B solo se eseguita con mezzo di contrasto permette di discriminare l'ictus ischemico dall'ictus emorragico

C e' l'unico modo per discriminare se il paziente si puo' giovarsi della terapia trombolitica

D** serve ad escludere la presenza di emorragie

www.infermiereonline.altervista.org

4) **Quale tra le seguenti non è una complicanza tipica dell’ernia?**

a) Strozzamento
b) Intasamento
c) **Fistolizzazione
d) Irriducibilità

5) **La frattura bimalleolare instabile necessita di**:

A bendaggio funzionale

B** stabilizzazione chirurgica

C stivaletto gessato

D gesso coscia-piede

www.infermiereonline.altervista.org

6) **Il segno di Trusseau e' caratteristico**:

A dell'ipercalcemia

B dell'iponatremia

C della crisi tireotossica

D* dell'ipocalcemia

7) **Lo Stato di Male Epilettico e' definito come:**

A Convulsioni continue della durata di 60 minuti

B* Convulsioni intermittenti della durata di 30 minuti, senza recupero di coscienza tra le crisi

C Convulsioni intermittenti della durata di 30 minuti, con recupero di coscienza tra le crisi

D) Convulsioni continue di durata sempre inferiore a 30 minuti

www.infermiereonline.altervista.org

8) **Il megacolon tossico e' complicanza di**

A celiachia

B avvelenamento

C trauma

D** colite ulcerosa

www.infermiereonline.altervista.org

9) **Cosa si intende per "door to ballon**"?

A il tempo che intercorre tra la comparsa di dolore toracico e l'arrivo sul paziente di un equipaggio dell'emergenza territoriale

B il tempo che intercorre tra l'arrivo dei soccorritori sul territorio ed il gonfiaggio del manicotto per misurare la pressione arteriosa

C* in corso di dolore toracico il tempo che intercorre tra l'arrivo alla porta dell'ospedale (Pronto Soccorso) ed il gonfiaggio del palloncino per effettuare l'angioplastica coronaria percutanea.

D il tempo necessario a intubare il paziente che necessita di assistenza respiratoria (cuffiare il tubo endotracheale)

il tempo di trasporto dalla porta dell'ospedale ai reparti di rianimazione

www.infermiereonline.altervista.org

10) **L’ossigeno è conservato:**
   a) **In bombole con l’ogiva bianca
   b) In bombole con l’ogiva gialla
   c) In bombole con l’ogiva blu
   d) In bombole con l’ogiva rossa

11) **La sindrome della narcosi da CO2:**

A non si verifica nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

B non si verifica nelle patologie polmonari restrittive

C* nei soggetti ipercapnici il quadro clinico puo' peggiorare con la somministrazione di O2

D si verifica nei quadri di ipocapnia cronica

www.infermiereonline.altervista.org

12) **Un paziente affetto da botulismo quali segni presenta?**

A* Segni neurologici con paralisi bulbare

B Ipersalivazione

C Ottundimento del sensorio

D Diarrea persistente

www.infermiereonline.altervista.org

13) **Per emartro s'intende:**
a) Emorragia in un arto
b) **Emorragia nel cavo articolare
c) Emorragia di origine arteriosa
d) Emorragia di origine sconosciuta

www.infermiereonline.altervista.org

14) **Quali batteri causano piu' comunemente la colangite acuta?**

A Pseudomonas

B Salmonella e Shigella

C Klebsiella, Mycoplasma e Clamydia

D ** E. Coli, B. Fragilis

www.infermiereonline.altervista.org

15) **Per aneurisma dissecante s'intende:**
a) Un aneurisma dei vasa vasorum
b) **Un aneurisma che scolla le tuniche arteriose
c) Un aneurisma della cerebrale anteriore
d) Un aneurisma congenito addominale

16) **La piu' comune causa di morte in donne che manifestano eclampsia e' rappresentata da:**

A rottura di fegato

B insufficienza renale acuta

C ** emorragia cerebrale

D embolia polmonare

www.infermiereonline.altervista.org

17) **Quale delle seguenti complicanze possono comparire in caso di annegamento?**

A Ipotermia

B Polmonite ab ingestis

C Edema polmonare

D ** Tutte le precedenti

www.infermiereonline.altervista.org

18) **L'ingestione cronica di liquirizia puo' provocare:**

A ipotensione e ipopotassiemia

B ipotensione e iponatremia

C ipertensione e iperpotassiemia

D * ipertensione e ipopotassiemia

19) **Quale e' il farmaco di scelta per la cardioversione farmacologia di una fibrillazione atriale quando vi sia una insufficienza ventricolare sinistra?**

A* amiodarone

B flecainide

C propafenone

D sotalolo

20) **Una midriasi si rivela abitualmente nel coma:**

A ipoglicemico

B* iperglicemico

C uremico

D da oppiacei

21) **Nell'Infarto miocardico acuto (IMA) e' importante somministrare?**

A** Aspirina e beta-bloccanti

B Calcio-antagonisti e fleicanide

C Ringer lattato e vitamina K

D Nessuno dei precedenti

22) **Il Glasgow Coma Score (GCS) valuta il livello di coscienza di una persona. Richiede la determinazione quantitativa di un punteggio sulla base del rilievo di alcune variabili. Tutti i seguenti parametri si ritrovano nella valutazione del Glasgow Coma Score (GCS), TRANNE:**

A** Le pupille sono uguali e reagenti alla luce

B Il paziente obbedisce ai comandi

C Il paziente ha gli occhi aperti e parla

D Il paziente apre gli occhi in risposta ad un comando

www.infermiereonline.altervista.org

23) **Nella radiografia diretta dell'addome, qual'e' il significato della "ansa sentinella"?**

A indica un processo infiltrativo intestinale

B e' indice di ischemia intestinale con edema della parete intestinale e dunque ipodiafania alla radiografia.

C suggerisce la presenza di aderenze dell'ansa intestinale con ipomobilita' della stessa.

D* rappresenta la distensione con o senza livello idro-aereo di un'ansa intestinale in corrispondenza di un'area di intestino infiammata.

. www.infermiereonline.altervista.org

24) **Quale e' la percentuale di infarti del miocardio che si presenta con un ECG non diagnostico?**

A 5 %

B 20 %

C ** 50%

D 70%

25) **Quale di queste sostanze e' usato come antidoto in corso di emorragia da eparina?**

A acetazolamide

B tromexan

C** solfato di protamina

D citrato di Na

26) **Il Glasgow Coma Scale (GCS) prende in esame i seguenti elementi:**

A* Apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie

B Chiusura occhi, risposte verbali, deficit neurologici

C Apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato

D Diametro delle pupille, risposte verbali, risposte motorie

www.infermiereonline.altervista.org

27) **Per bronchite cronica si intende:**

A** Sindrome caratterizzata dalla presenza di tosse ed espettorato per almeno 3 mesi e 2 anni consecutivi

B Sindrome caratterizzata dallo sviluppo di una progressiva riduzione del flusso aereo espiratorio non completamente reversibile

C Sindrome caratterizzata da una riduzione del flusso aereo espiratorio solitamente reversibile

D Sindrome caratterizzata da crisi di broncospasmo su base allergica

28) **Se trovo un soggetto in apparente stato di perdita di coscienza, cosa devo fare immediatamente?**

A Inizio la rianimazione cardiopolmonare

B Inizio la respirazione bocca a bocca

C Vado a chiamare il 118

D** Stimolo il soggetto, valuto e verifico che vi sia perdita di coscienza

www.infermiereonline.altervista.org

29) **La terapia insulinica endovena. nelle sindromi iperglicemiche (chetoacidosi diabetica e sindrome iperosmolare) si associa a**

A** Riduzione della potassiemia

B Riduzione della calcemia

C Aumento della potassiemia

D Riduzione della sodiemia

30) **Nelle vittime di ipotermia severa: quale e' la modalita' terapeutica piu' appropriata?**

A Somministrazione endovenosa di levotiroxina sodica 25 µg ogni 8 ore

B* Riscaldamento attivo interno (ventilazione con O2 riscaldato e umidificato,
somministrazione di liquidi riscaldati, riscaldamento con circolazione extracorporea...)

C Massaggio e mobilizzazione continua degli arti del paziente

D Riscaldamento passivo esterno

www.infermiereonline.altervista.org

31) **Definizione di "aprassia":**

A incapacita' di riconoscere persone familiari, luoghi, oggetti noti

B perdita della capacita' di esprimere a parole o per iscritto idee coerenti o di capire il linguaggio parlato o di leggere

C** perdita della capacita' di eseguire su richiesta particolari gesti o movimenti, senza che vi sia paralisi

D ridotto autocontrollo nel dire o nel fare

32) **Segni affidabili per differenziare tra sincope e crisi epilettica:**

A** Morsus linguale e periodo post-critico

B Testimonianza oculare di scosse tonico-cloniche durante la perdita di coscienza

C Perdita di urine

D Acufeni precedenti la perdita di coscienza

www.infermiereonline.altervista.org

33) **Che concentrazione di ossigeno ha l'aria ambiente?**

A 80%

B 10%

C 55%

D D* 21%

www.infermiereonline.altervista.org

34) **Quali tra le seguenti patologie non e' soggetta a denuncia obbligatoria da parte del medico?**

A febbre gialla

B** polmonite da Pseudomonas Aeruginosa

C tifo esantematico

D rabbia

www.infermiereonline.altervista.org

35) **L'uso del carbone vegetale attivato e' indicato in tutte le seguenti condizioni, tranne una. Quale?**

A Avvelenamento da digitale

B Intossicazione da teofillina

C Ingestione di ovuli di stupefacenti

D ** Ingestione di caustici

www.infermiereonline.altervista.org